

*LES OISEAUX DES COLLECTIONS VIVANTES  
DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE*

Par Ach. URBAIN, E. DECHAMBRE et Mlle M.-A. PASQUIER.

Les Oiseaux des collections vivantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, sont actuellement au nombre de 3.000. Ils se répartissent de la façon suivante<sup>1</sup>.

**A. Sous-classe des RATITES**

**I. — Ordre des STRUTHIONIFORMES**

STRUTHIONIDÉS :

Autruche	<i>Struthio camelus</i> L.	PZ
----------	----------------------------	----

**II. — Ordre des RHÉIFORMES**

RHEIDÉS :

Nandou blanc.	<i>Rhea americana</i> L. (v. <i>alba</i> ).	PZ
Nandou gris.	<i>Rhea americana</i> L.	PZ

**III. — Ordre des CASUARIFORMES**

CASUARIDÉS :

Casoar à casque.	<i>Casuarius casuarius</i> L.	M	PZ
Casoar bicaronculé.	<i>C. bicarunculatus</i> (Sclater).	PZ	
Casoar uniappendiculé.	<i>C. unappendiculatus</i> Blyth.	PZ	

DROMICÉIDÉS :

Emeu.	<i>Dromiceius Novae-Hollandiae</i> (Latham).	M	PZ
-------	---	---	----

**B. Sous-classe des IMPENNÉS**

**Ordre des SPHENISCIFORMES**

SPHÉNISCIDÉS :

Manchot du Cap.	<i>Spheniscus demersus</i> L.	PZ
Manchot de Magellan.	<i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster)	PZ
Manchot papou.	<i>Pygoscelis papua</i> (Forster).	PZ

1. M = Ménagerie du Jardin des Plantes.

PZ = Parc Zoologique du Bois de Vincennes.

**C. Sous-classe des CARINATES**

**I. — Ordre des LARIFORMES**

LARIDÉS :

Goéland argenté.	<i>Larus argentatus</i> Pontop.	M	PZ
Goéland marin.	<i>Larus marinus</i> L.	M	
Mouette rieuse.	<i>Larus ridibundus</i> L.	M	PZ
Risse tridactyle.	<i>Rissa tridactyla</i> (L.).	M	

**II. — Ordre des CHARADRIIFORMES**

CHARADRIIDÉS :

Vanneau armé du Brésil.	<i>Belonopterus cayennensis</i> (Gm.).		PZ
Vanneau Suisse.	<i>Squatarola squatarola</i> (L.).	M	

HAEMATOPODIDÉS :

Huitrier-pie.	<i>Haematopus ostralegus</i> L.	M	PZ
---------------	---------------------------------	---	----

SCOLOPACIDÉS :

Combattant.	<i>Philomachus pugnax</i> (L.).	M	PZ
Barge rousse.	<i>Limosa lapponica</i> (L.).		PZ
Courlis corlieu.	<i>Numenius phaeopus</i> (L.).	M	PZ
Courlis cendré.	<i>Numenius arquata</i> (L.).		PZ
Maubèche.	<i>Calidris canutus</i> (L.).	M	PZ
Tourne-pierre interprète.	<i>Arenaria interpres</i> (L.).	M	PZ
Chevalier gambette.	<i>Tringa totanus</i> (L.).	M	PZ

**III. — Ordre des RALLIFORMES**

RALLIDÉS :

Râle à bec vert.	<i>Aramides cajanea</i> (Müller).		PZ
Râle d'eau.	<i>Rallus aquaticus</i> L.	M	
Poule d'eau.	<i>Gallinula chloropus</i> L.	M	PZ
Poule sultane bleue.	<i>Porphyrio porphyrio</i> L.		PZ
Poule sultane à tête grise.	<i>P. poliocephalus</i> (Latham).	M	
Poule sultane d'Edwards.	<i>P. Edwardsi</i> Elliot.		PZ

PSOPHIIDÉS :

Agami.	<i>Psophia crepitans</i> L.	M	
--------	-----------------------------	---	--

FULICIDÉS :

Foulque noire.	<i>Fulica atra</i> L.		PZ
----------------	-----------------------	--	----

**IV. — Ordre des OTIDIFORMES**

OTIDIDÉS :

Outarde houbara.	<i>Chlamydotis undulata</i> Jacquin.		PZ
------------------	--------------------------------------	--	----

V. — Ordre des GRUIFORMES

BALÉARICIDÉS :

Grue antigone.	<i>Grus antigone antigone</i> (L.).	M	PZ
Grue cendrée.	<i>Grus grus</i> L.		PZ
Grue cendrée asiatique.	<i>Grus grus Lilfordi</i> Sharpe.	M	PZ
Grue blanche asiatique.	<i>Grus leucogeranus</i> Pallas.		PZ
Grue à cou blanc.	<i>Grus vipio</i> Pallas.		PZ
Grue de Stanley.	<i>Anthropoides paradisea</i> (Lichst.)	M	PZ
Grue de Numidie.	<i>Anthropoides virgo</i> (L.).	M	PZ
Grue couronnée.	<i>Balearica pavonina</i> (L.).	M	PZ
Grue de Mandchourie.	<i>Grus japonensis</i> (Müller).	M	PZ

CARIAMIDÉS :

Cariama huppé.	<i>Cariama cristata</i> L.	M	PZ
Cariama de Burmeister.	<i>Chunga Burmeisteri</i> (Hart.).	M	

VI. — Ordre des COLUMBIFORMES

GOURIDÉS :

Goura couronné.	<i>Goura cristata</i> (Pallas).	PZ	
Goura de Victoria.	<i>Goura Victoria</i> (Fraser).		PZ

TRÉRONIDÉS :

Pigeon vert.	<i>Treron sp.</i>	M	
--------------	-------------------	---	--

COLUMBIDÉS :

Pigeon biset.	<i>Columba livia</i> Gmelin.	M	
Pigeon columbin.	<i>Columba oenas</i> L.	M	
Pigeon picazuro.	<i>Columba picazura</i> Tem.	M	

TURTURIDÉS :

Colombe poignardée.	<i>Gallicolumba luzonica</i> (Scop.).	M	
Tourterelle vineuse.	<i>Streptopelia vinacea</i> (Gmelin).	M	
Tourterelle à collier.	<i>Streptopelia decaocto</i> (Friv.).	M	
Tourterelle minute.	<i>Columbigallina minuta</i> (L.).	M	
Tourterelle à ailes tachetées.	<i>Oena capensis</i> (L.).	M	
Tourterelle à masque noir.	<i>Henicophaps albifrons</i> Gray.	M	
Tourterelle à front blanc.			

PTÉROCLIDIIDÉS :

Ganga ventre brûlé.	<i>Pterocles exustus</i> Tem.	M	
---------------------	-------------------------------	---	--

VII. — Ordre des GALLIFORMES

CRACIDÉS :

Hocco alector.	<i>Crax nigra</i> L.	PZ	
Hocco à bec de rasoir.	<i>Mitu mitu</i> L.	M	PZ
Hocco de Slater.	<i>Crax fasciolata</i> Gray.		PZ
Hocco caronculé.	<i>Crax globulosa</i> Spix.	M	
Hocco globicière.	<i>Crax rubra</i> L.	M	
Pénélope huppée.	<i>Penelope cristata</i> (L.).	M	
Pénélope pourprée.	<i>P. purpurascens</i> Wagler.	M	

Pénélope à poitrine rousse.	<i>Penelope pileata</i> Wagler.	PZ
Pénélope siffleuse.	<i>Pipile cumanensis</i> Jacquin.	PZ
<b>PHASIANIDÉS :</b>		
Perdrix de Formose.	<i>Bambusicola sonorivox</i> (Gould).	M
Perdrix de Tripolitaine.	<i>Alectoris barbara barbata</i> (Rchb.)	M
Perdrix rouge.	<i>Alectoris rufa</i> (L.).	M
Caille.	<i>Coturnix coturnix</i> (L.).	M
Faisan lophophore.	<i>Lophophorus impeyanus</i> (Latham)	M
Faisan hoki brun.	<i>Crossoptilon mandchuricum</i> Sw.	M
Faisan hoki bleu.	<i>Crossoptilon auritum</i> (Pallas).	PZ
Faisan argenté.	<i>Gennaeus nycthemerus</i> L.	M
Faisan de Berlioz.	<i>Gennaeus nycthemerus</i> Berliozi. Delac. et Jab.	PZ
Faisan leucomèle.	<i>G. leucomelanus</i> (Latham).	M
Faisan à huppe blanche.	<i>G. leucomelanus Hamiltoni</i> (Gray).	M
Faisan de Swinhoe.	<i>Hierophasis Swinhonis</i> (Gould).	M
Faisan d'Edwards.	<i>H. Edwardsii</i> (Oustalet).	M
Faisan Prélat.	<i>Diardigallus Diardi</i> (Bonap.).	PZ
Faisan de Wallich.	<i>Catreus Wallichii</i> (Hardwich).	M
Faisan commun.	<i>Phasianus colchicus colchicus</i> L.	PZ
Faisan blanc.	<i>P. colchicus colchicus</i> , v. <i>alba</i> L.	M
Faisan à collier.	<i>P. colchicus torquatus</i> (Gmelin).	M
Faisan vénéré.	<i>Syrmaticus Reevesi</i> (Gray).	PZ
Faisan de Soemmering.	<i>S. Soemmerringii</i> (Temminck).	M
Faisan d'Amherst.	<i>Chrysophorus Amherstiae</i> (Leadbeater).	PZ
Faisan doré.	<i>Chrysophorus pictus</i> (L.).	M
Eperonnier de Germain.	<i>Polypectron Germaini</i> Elliot.	M
Rheinardte ocellé.	<i>Rheinardia ocellata</i> (Elliot).	M
Dindon sauvage.	<i>Melleagris galloparo</i> L.	PZ
Pintade ordinaire.	<i>Numida galeata</i> Pallas.	M
Pintade du Maroc.	<i>Numida Sabyi</i> Hartest.	PZ
Pintade huppée.	<i>Guttera barbata</i> Ghigi.	PZ
Pintade vulturine.	<i>Aeryllium vulturinum</i> (Hardw.)	PZ
Paon bleu.	<i>Pavo cristatus</i> L.	M
Paon blanc.	<i>Pavo cristatus</i> L., v. <i>alba</i> .	PZ
Paon nigripenne.	<i>P. cristatus</i> L., v. <i>nigripennis</i> .	PZ
Paon spicifère.	<i>Pavo muticus</i> L.	PZ
<b>VIII. — Ordre des ANHIMIFORMES</b>		
<b>ANHIMIDÉS :</b>		
Kamichi à collier.	<i>Chauna torquata</i> (Oken).	M
Kamichy de Derby.	<i>Chauna chavaria</i> (L.).	PZ

IX. — Ordre des ANSERIFORMES

CYGNIDÉS :

Cygne muet.

Cygne noir.

Cygne à cou noir.

Cygne coscoroba.

*Cygnus olor* Gmelin.

M PZ

*Chenopsis atrata* (Latham).

M PZ

*Cygnus melanocoryphus* (Mol.).

M PZ

*Coscoroba coscoroba* (Mol.).

M PZ

ANATIDÉS :

Sarcidiorne à bosse.

*Sarkidiornis melanota* (Pennant).

PZ

Sarcidiorne à crête.

*S. carunculata* (Licht.).

PZ

Canard à ailes blanches.

*Asarcornis scutulata* (Müller).

M PZ

Canard Carolin.

*Aix sponsa* L.

M PZ

Canard mandarin.

*Aix galericulata* (L.).

M PZ

Tadorne de Belon.

*Tadorna tadorna* (L.).

M PZ

Tadorne radjah.

*Tadorna radjah* (Lesson).

PZ

Casarca roux.

*Casarca ferruginea* (Pallas).

M PZ

Casarca de Paradis.

*Casarca variegata* (Gmelin).

M PZ

Casarca du Cap.

*Casarca cana* (Gmelin).

M

Dendrocygne discolore.

*Dendrocygna discolor* (Sclater et Salvin).

PZ

Dendrocygne à lunules.

*D. arcuata* (Horsfield).

PZ

Dendrocygne veuf.

*D. viduata* (L.).

PZ

Dendrocygne à bec rouge.

*D. autumnalis* (L.).

M PZ

Canard sauvage.

*Anas platyrhynchos* L.

M PZ

Canard pilet.

*A. acuta* L.

PZ

Canard de Bahama.

*A. bahamensis* L.

M PZ

Canard siffleur du Chili.

*A. sibilatrix* Poeppig.

PZ

Sarcelle d'hiver.

*A. crecca* L.

PZ

Sarcelle d'été.

*A. querquedula* L.

M PZ

Sarcelle formose.

*A. formosa* Georgi.

PZ

Sarcelle du Chili.

*A. flavirostris* Vieillot.

PZ

Canard ondulé.

*A. undulata* Du Bois.

M

Canard à bec tacheté.

*A. poecilorhyncha* Forster.

M PZ

Canard de Barbarie.

*Cairina moschata* L.

M

Canard peposaca.

*Metopiana peposaca* Vieillot.

PZ

Canard brante.

*Netta rufina* Pallas.

PZ

Canard nyroca.

*Nyroca nyroca* (Guld.).

PZ

ANSÉRIDÉS :

Oie d'Egypte.

*Alopochen aegyptiaca* (L.).

PZ

Oie des Moissons.

*Anser fabalis* (Latham).

PZ

Oie de Guinée.

*Cygnopsis cygnoides* (L.).

PZ

Oie barrée.

*Anser indicus* (Latham).

M PZ

Oie empereur.

*Anser canagicus* (Sewast).

M PZ

Oie de Ross.

*Anser Rossii* (Cassin).

PZ

Oie armée de Gambie.

*Plectropterus gambensis* (L.).

M PZ

Oie céréopse.

*Cereopsis Novoe-Hollandiae*

(Latham).

PZ

Bernache du Canada.	<i>Branta canadensis</i> (L.).	M	PZ
Bernache nonette.	<i>Branta leucopsis</i> (Bechst.).		PZ
Bernache cravant.	<i>Branta bernicla</i> (L.).		PZ
Bernache de Magellan.	<i>Chloephaga leucoptera</i> (Gmelin)	M	PZ
Bernache à tête grise.	<i>C. poliocephala</i> (Sclater).	M	PZ
Bernache à ailes bleues.	<i>Cyanochen cyanopterus</i> (Rup.).	M	FZ

X. — Ordre des PHÉNICOPTÉRIFORMES

PHÉNICOPTÉRIDÉS :

Flamant rose.	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pall.	M	PZ
Flamant rouge.	<i>P. ruber</i> L.	M	PZ
Flamant du Chili.	<i>P. chilensis</i> (Molina).	M	PZ

XI. — Ordre des ARDÉIFORMES

PLÉGADIDIDÉS :

Ibis rouge.	<i>Guara rubra</i> (L.).	M	PZ
Ibis sacré.	<i>Threskiornis aethiopica</i> (Latham).		PZ
Ibis à tête noire.	<i>T. melanocephala</i> (Latham).	M	PZ
Ibis falcinelle.	<i>Plegadis falcinellus</i> (L.).		PZ

PLATALÉIDÉS :

Spatule blanche.	<i>Platalea leucorodia</i> (L.).	PZ	
Spatule rose.	<i>Ajaja ajaja</i> (L.).		PZ

CICONIIDÉS :

Cigogne blanche.	<i>Ciconia ciconia</i> L.	M	PZ
Cigogne noire.	<i>Ciconia nigra</i> L.	M	PZ
Cigogne maguari.	<i>Euxenura galeata</i> (Molina).		PZ
Cigogne épiscopale.	<i>Dissoura episcopus</i> Boddaert.		PZ
Jabiru asiatique.	<i>Xenorhynchus asiaticus</i> (Latham).	M	PZ
Jabiru du Sénégal.	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> Shaw.	M	PZ
Marabout d'Afrique.	<i>Leptoptilus crumeniferus</i> (Lesson).	M	PZ
Marabout asiatique.	<i>Leptoptilus dubius</i> (Gmelin).		PZ
Tantale américain.	<i>Mycteria americana</i> L.		PZ
Tantale asiatique.	<i>Ibis cinereus</i> (Raffles).		PZ
Tantale africain.	<i>Ibis ibis</i> (L.).		PZ
Tantale à tête blanche.	<i>Ibis leucocephalus</i> , Pennant.	M	

ARDÉIDÉS :

Héron cendré.	<i>Ardea cinerea</i> L.	M	PZ
Héron Goliath.	<i>Ardea goliath</i> Cretzschmar.	M	
Héron garde-bœuf.	<i>Bubulcus ibis</i> L.	M	PZ
Héron Bihoreau.	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (L.).	M	PZ
Bihoreau d'Argentine.	<i>N. n. cyanocephalus</i> (Molina).	M	
Grande Aigrette.	<i>Casmerodius albus</i> (L.).	M	PZ

Aigrette garzette.	<i>Egretta garzetta</i> (L.).	M	PZ
Aigrette d'Indochine.	<i>Egretta intermedia</i> (Wagl.).	M	PZ
BALAEENICIPIDÉS :			
Baleniceps roi.	<i>Balaeniceps rex</i> Gould.	M	
XII. — Ordre des PÉLÉCANIFORMES			
PÉLÉCANIDÉS :			
Pélican à bec rouge.	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i> (Gmelin).	PZ	
Pélican roussâtre.	<i>Pelecanus rufescens</i> (Gmelin).	PZ	
Pélican blanc.	<i>Pelecanus onocrotalus</i> L.	M	
Pélican rose.	<i>Pelecanus roseus</i> Gmelin.	M	PZ
PHALACROCORACIDÉS :			
Grand Cormoran.	<i>Phalacrocorax carbo</i> L.	M	
SULIDÉS :			
Fou de Bassan.	<i>Sula bassana</i> (L.).	M	
XIII. — Ordre des FALCONIFORMES			
VULTURIDÉS :			
Vautour condor.	<i>Vultur gryphus</i> L.	M	
Vautour pape.	<i>Sarcoramphus papa</i> (L.).	M	
Catharte à tête rouge.	<i>Cathartes aura</i> (L.).	M	
Catharte à tête jaune.	<i>Cathartes urubitenga</i> Pelz.	M	
ACCIPITRIDÉS :			
Vautour moine.	<i>Aegypius monachus</i> (L.).	M	
Vautour fauve.	<i>Gyps fulvus</i> (Temm.).	M	
Néophron moine.	<i>Necrosyrtes monachus</i> (Temm.).	M	
Néophron percnoptère.	<i>Neophron percnopterus</i> (L.).	M	
Caracara.	<i>Polyborus plancus</i> (Miller).	M	
Aigle royal.	<i>Aquila chrysaëtos</i> (L.).	M	
Aigle Bonelli.	<i>Hieraëtus fasciatus</i> (Vieillot).	M	
Aigle botté.	<i>Hieraëtus pennatus</i> (Gmelin).	M	
Spizaète couronné.	<i>Stephanoaëtus coronatus</i> L.	M	
Pygargue vocifer.	<i>Haliaetus vocifer</i> (Daud.).	M	
Gypohiérap.	<i>Gypohierax angolensis</i> (Gm.).	M	
Aigle bateleur.	<i>Terathopius ecaudatus</i> (Daudin).	M	
Milan royal.	<i>Milvus milvus</i> (L.).	M	PZ
Milan noir.	<i>M. migrans migrans</i> (Bodd.).	M	
Milan à bec jaune.	<i>M. migrans oegyptius</i> (Gm.).	M	
Milan rayé.	<i>Milvus lineatus</i> (Gray).	M	
Milan à cou blanc.	<i>Haliastur indus</i> (Bodd.).	M	
Buse commune.	<i>Buteo buteo</i> .	M	PZ
Buse féroce.	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzs.).	M	
Buse aguia.	<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot).	M	
Gymnogène rayé.	<i>Gymnogenus typicus</i> (Smith).	M	

FALCONIDÉS :

Faucon lanier.	<i>Falco biarmicus</i> Temm.	M
Faucon crécerelle.	<i>Falco timunculus</i> L.	M
Faucon crécerine.	<i>Falco Naumannii</i> Fleischer.	M
Faucon Gerfault.	<i>Falco rusticulus</i> L.	M

XIV. — Ordre des STRIGIFORMES

STRIGIDÉS :

Grand duc d'Europe.	<i>Bubo bubo</i> (L.).	M
Grand duc de Fraser.	<i>Bubo ascalaphus</i> Sav.	M
Grand duc à poitrine rayée.	<i>Huhua poensis</i> Fraser.	M
Moyen duc.	<i>Asio otus</i> (L.).	M
Chouette kétupa.	<i>Ketupa ketupa</i> (Horsf.).	M
Chouette effraye.	<i>Tyto alba</i> (L.).	M
Chouette hulotte.	<i>Strix aluco</i> L.	M
Chouette chevêche.	<i>Athene noctua</i> (Scop.).	M
Chouette de Mauritanie.	<i>Athene noctua glauxa</i> (Sav.).	M
Harfang des neiges.	<i>Nyctea scandiaca</i> L.	M

XV. — Ordre des PSITTACIFORMES

CACATUIDÉS :

Microglosse noir.	<i>Probosciger aterrimus</i> (Gm.).	PZ
Cacatoès de Banks.	<i>Calyptorhynchus magnificus</i> (Schaw et Nod.).	PZ
Cacatoès à huppe jaune.	<i>Kakatoe galerita</i> (Latham).	PZ
Petit cacatoès à huppe jaune.	<i>Kakatoe sulphurea</i> (Gmelin).	M
Cacatoès de Leadbeater.	<i>Kakatoe leadbeateri</i> (Vigors).	PZ
Cacatoès des Moluques.	<i>Kakatoe moluccensis</i> (Gmelin).	M
Cacatoès rosalbin.	<i>Kakatoe roseicapilla</i> (Vieillot).	PZ
Cacatoès nasique.	<i>Licmetis tenuirostris</i> Kühl.	PZ
Perruche calopsitte.	<i>Nymphicus hollandicus</i> (Kerr).	M

PSITTACIDÉS :

Ara de Lear.	<i>Anodorhynchus Leari</i> Bonap.	PZ
Ara hyacinthe.	<i>A. hyacinthinus</i> Latham.	PZ
Ara macao.	<i>Ara macao</i> , L.	PZ
Ara chloroptère.	<i>Ara chloroptera</i> Gray.	M
Ara ararauna.	<i>Ara ararauna</i> L.	PZ
Ara militaire.	<i>Ara militaris</i> L.	M
Ara de Spix.	<i>Ara Spixii</i> (Wagl.).	M
Amazone à front bleu.	<i>Amazona amazonica</i> (L.).	PZ
Amazone à calotte bleue.	<i>Amazona aestiva</i> L.	M
Amazone à queue rouge.	<i>Amazona mercenaria</i> Tsch.	M
Amazone à front jaune.	<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin)	M
Amazone farineux.	<i>Amazona farinosa</i> (Bodd.).	M
Perroquet du Sénégal.	<i>Poicephalus senegalensis</i> (L.).	M
Perroquet Jaco.	<i>Psittacus erithacus</i> L.	M
Perroquet de Pesquet.	<i>Psittichas fulgidus</i> (Lesson).	PZ
Papageai.	<i>Deroptyus accipitrinus</i> (L.).	M

Perruche souris.	<i>Myopsittacus monachus</i> (Bodd.).	M
Perruche à tête jaune.	<i>Aratinga jandaya</i> (Gm.).	M
Perruche à tête noire.	<i>Aratinga nenday</i> (Vieillot).	M
Perruche des cactées.	<i>Aratinga cactorum</i> (Kühl).	M
Perruche inséparable à tête grise.	<i>Agapornis cana</i> (Gm.).	M
Perruche à collier du Sénégal.	<i>Psittacula Krameri Krameri</i> (Scop.).	M
Perruche à collier de l'Inde.	<i>P. Krameri manillensis</i> Bechst.	M
Perruche à tête prune.	<i>P. cyanocephala</i> (L.).	M
Perruche ondulée verte, bleue, jaune, blanche.	<i>Melopsittacus undulatus</i> Schaw.	M
TRICHOGLOSSIDÉS :		
Lori des Moluques.	<i>Domicella garrulus</i> L.	M
<b>XVI. — Ordre des CUCULIFORMES</b>		
CUCULIDÉS :		
Coucou terrestre de Renauld.	<i>Carpococcyx Renauldi</i> Oust.	M
MUSOPHAGIDÉS :		
Touraco à joues blanches.	<i>Turacus leucotis</i> (Rüpp).	M
<b>XVII. — Ordre des PICIFORMES</b>		
RHAMPASTIDÉS :		
Toucan à gorge jaune et blanche.	<i>Rhamphastos vitellinus</i> (Lichst)	M
Toucan ariel.	<i>Rhamphastos ariel</i> Vig.	M
Toucanet à bec tacheté.	<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichst.).	M
<b>XVIII. — Ordre des CORACIIFORMES</b>		
BUCÉROTIDÉS :		
Calao d'Abyssinie.	<i>Bucorvus abyssinicus</i> (Boddaert).	M PZ
Calao de Cafrerie.	<i>Bucorvus cafer</i> (Schl.).	PZ
Calao de l'Inde.	<i>Anthracoceros convexus</i> (Temm.)	M
<b>XIX. — Ordre des PASSERIFORMES</b>		
CORVIDÉS :		
Grand corebau.	<i>Corvus corax</i> L.	M PZ
Corbeau choucas.	<i>Colaeus monedula</i> L.	M
Pie de France.	<i>Pica pica</i> L.	M
Pie acahé.	<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot).	M
Pie bleue de Chine.	<i>Urocissa erythrorhyncha</i> (Gm.).	M
PARADISÉIDÉS :		
Paradisier rouge.	<i>Uranornis rubra</i> Daud.	M

ICTÉRIDÉS :

Troupiale.

*Icterus icterus* (L.).

M

TANAGRIDÉS :

Tangara écarlate.

*Rhamphocaelus brasilius* (L.).

M

Tangara jacapa.

*Rhamphocoelus carbo* (Pall.).

M

Tangara noir.

*Tachyphonus rufus* (Bodd.).

M

FRINGILLIDÉS :

Pinson de France.

*Fringilla coelebs* L.

M

Chardonneret élégant.

*Carduelis carduelis* (L.).

M

Verdier.

*Chloris chloris* (L.).

M

Serin.

*Serinus canaria* (L.).

M

Bouvreuil ponceau.

*Pyrrhula pyrrhula europaea* (L.).

M

Bouton d'Or.

*Syndactylus flaveola* (L.).

M

Cardinal rouge.

*Cardinalis cardinalis* (L.).

M

Sporophile à gorge blanche.

*Sporophila albogularis* (Spix).

M

Bruant jaune.

*Emberiza citrinella* L.

M

Pinson couronné gris.

*Coryphospingus pileatus* (Wied.)

M

Paroare dominicain.

*Paroaria larvata* (Bodd.).

M

PLOCÉIDÉS :

Ignicolore.

*Euplectes franciscana* (Isert).

M

Tisserin du Cap.

*Euplectes capensis* (L.).

M

Worabée.

*Euplectes afra* Gm.

M

Astrild à bec de corail.

*Estrilda astrild* (L.).

M

Travailleur.

*Quelea quelea* (L.).

M

Amaranthe ou Sénégali.

*Lagonostica senegala* (L.).

M

Bec d'argent.

*Euodice cantans* (Gmelin).

M

Veuve à collier.

*Steganura paradisaca* (L.).

M

Cou coupé.

*Amadina fasciata* (Gm).

M

Bengali vert.

*Stictopiza formosa* (Lath.).

M

Calfat gris.

*Padda ozyzivora* (L.).

M

Diamant à bavette.

*Poephila cincta* (Gould).

M

Diamant mandarin.

*Taenopygia castanotis* (Gould)

M

ALAUDIDÉS :

Alouette calandre.

*Melanocorypha calandra* (L.).

PZ

STURNIDÉS :

Merle métallique à longue queue.

*Lamprotornis caudatus* (Müller).

M

Spréo superbe.

*Spreo superbus* (Rüpp.).

M

TIMALIIDÉS :

Rossignol du Japon.

*Liothrix lutea* (Scop.).

M

(Laboratoire d'Ethologie des Animaux sauvages, du Muséum).